

## EINARBEITUNGSPROTOKOLL: DURCHFÜHRUNG EINER TRANSFUSION (VERSION 2)

### Ärztlicher Mitarbeiter

Jeder neue ärztliche Mitarbeiter wird möglichst frühzeitig durch den Transfusionsbeauftragten seiner Abteilung eingewiesen.

Vorgesehener Ablauf:

1. Erstes Einweisungsgespräch mit Vorstellung von
  - relevanten Inhalten des QM-Handbuchs
  - den Inhalten der Verfahrensanweisungen
  - Hygienerichtlinien
  - der im Intranet hinterlegten Einweisungspräsentation
2. Durchführung einer Transfusion unter Aufsicht des TB
3. Zweites Einweisungsgespräch mit Überprüfung der Kenntnisse und besonderem Hinweis
  - auf die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge bei der Anwendung von Blutkomponenten und Plasmaderivaten
  - das Meldewesen bei Transfusionsreaktionen
  - auf die Verpflichtung zur Teilnahme an abteilungs-/hausinternen Fortbildungsveranstaltungen.
4. Dokumentation durch Unterschrift
  - Durch Unterschrift dokumentiert der ärztlichen Mitarbeiter, dass ihm die vermittelten bzw. schriftlich fixierten transfusionsmedizinisch relevanten Verfahrensanweisungen und deren Erfordernisse bekannt sind, einschließlich der rechtlichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung.
5. Eigenständige Durchführung von Transfusionen
6. Nachschulung jederzeit bei Bedarf

Während des ganzen Prozesses durchgehend: Selbststudium

### Nicht-ärztliche Mitarbeiter

Die Planung und Durchführung der Schulung wird durch die Pflegedienstleistung organisiert. (Ziel: Erlangen der Kenntnisse um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge bei der Anwendung von Blutkomponenten und Plasmaderivaten.)

Die neuen Mitarbeiter in der Pflege werden besonders auf die entsprechenden Fortbildungen für die Pflege durch den Transfusionsverantwortlichen, die 2 – 3/Jahr stattfinden, hingewiesen.

### Nachschulung

Bei Bedarf soll jeder Mitarbeiter eine Nachschulung (ggf. im Umfang einer Einweisung) erhalten. Unbedingt bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als 2 Monaten